



## ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTERÓIDE PALATÁVEL PARA CÃES E GATOS

Uso Veterinário

### FÓRMULA

Cada comprimido contém:

Meloxitabs	0,5 mg	2 mg
Meloxicam	0,5 mg	2 mg
Excipientes q.s.p.	200 mg	800 mg

### DESCRIÇÃO

**Meloxitabs** é um anti-inflamatório não esteroide em formulação palatável com atividade inibidora seletiva da ciclooxigenase-2 (cox-2). O bloqueio seletivo da cox-2, proporcionado pelo Meloxicam, confere um duplo benefício terapêutico, pois resulta em uma excelente atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes benefícios, o Meloxicam inibe ainda a infiltração de leucócitos no tecido inflamado e previne a destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos degenerativos ósseos e cartilaginosos.

### INDICAÇÕES

**Meloxitabs** é indicado como analgésico, anti-inflamatório e antiexsudativo para cães e gatos, sendo especialmente indicado nas patologias dolorosas ou degenerativas, agudas ou crônicas, do aparelho osteomioarticular, tais como: osteites, artrites, artrites reumatóides, osteoartrites, espondiloses, espondiloartroses anquilosantes, displasias coxo-femurais, calcificação de discos intervertebrais, reparação de fraturas, pós-operatório de artroplastias e traumatismos.

### VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

Administrar o comprimido uma vez ao dia, em dosagem de acordo com a tabela abaixo.

Dosagem para Gatos	
Meloxitabs	0,5 mg
PRIMEIRO DIA DE TRATAMENTO 0,1 mg de Meloxitabs/kg de peso corporal	1 comprimido para cada 5 kg de peso. 

Dosagem para Cães		
Meloxitabs	0,5 mg	2,0 mg
PRIMEIRO DIA DE TRATAMENTO 0,2 mg de Meloxitabs/kg de peso corporal	2 comprimidos para cada 5 kg de peso.  	2 comprimidos para cada 20 kg de peso.  
SEGUNDO DIA DE TRATAMENTO EM DIANTE 0,1 mg de Meloxitabs/kg de peso corporal	1 comprimido para cada 5 kg de peso. 	1 comprimido para cada 20 kg de peso. 

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. Nos casos agudos recomenda-se o tratamento por 05 a 07 dias. Nos quadros crônicos podem ser necessários tratamentos prolongados por um período máximo de 28 dias, ou a critério do médico veterinário.

Em gatos, o tratamento não deverá passar 4 dias consecutivos, ou a critério do médico veterinário.

### CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

O produto não deve ser administrado em animais com antecedentes de hipersensibilidade ao Meloxicam.

Não administrar em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais severos.

Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentarem evidência de desordem hemorrágica ou hipersensibilidade ao produto.

Não administrar em cadelas ou gatas prenhes no terço final da gestação ou em lactação.

Não utilizar o produto em intoxicações por drogas anticoagulantes (Ex: Cumarina).

### PRECAUÇÕES

Obedeça às dosagens e vias de administração indicadas para o uso do produto. Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens recomendadas para o uso do produto.

O tratamento de animais idosos ou com menos de 06 semanas de idade deve ser cuidadosamente acompanhado pelo médico veterinário, sendo, em alguns casos, necessário reduzir a dosagem a ser administrada.

Descontinuar o tratamento na ocorrência de vômitos, diarreia ou perda de apetite.

### REAÇÕES ADVERSAS

Os choques anafiláticos em animais devido ao uso do **Meloxitabs** são raros, no entanto, o médico veterinário deve estar atento à possibilidade de ocorrência.

Podem ocorrer reações gerais como perda de apetite, vômito, diarreia, melena e apatia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento.

## INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não administrar juntamente com outros anti-inflamatórios esteroides ou não esteroides, ou imediatamente após o tratamento prolongado com estas drogas.

Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos.

Não administrar juntamente com agentes anticoagulantes como a varfarina e a aspirina.

## INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

O **Meloxitabs** é um anti-inflamatório não esteroide da família dos oxicans, e não possui antídoto específico. No caso de intoxicações, realizar tratamento sintomático.

## APRESENTAÇÃO

**Meloxitabs 0,5 mg** - Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos ou Display contendo 15 blisters com 10 comprimidos cada.

**Meloxitabs 2,0 mg** - Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos ou Display contendo 6 blisters com 10 comprimidos cada.

## PRAZO DE VALIDADE

02 (dois) anos, após a data de fabricação.

## CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº SP 000885-0.000019 em 24/04/2012.

## RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO VETERINÁRIO

Dr. Danillo Silva Marcon

CRMV - SP 36.982

## PROPRIETÁRIO

Laboratório Bio-Vet Ltda.

R. Cel. José Nunes dos Santos, 639

06731-320 - Vargem Grande Paulista - SP

CNPJ 60.411.527/0001-30

INDÚSTRIA BRASILEIRA

## FABRICANTES

Ourofino Saúde Animal Ltda.

Rod. Anhanguera - SP 330 - km 298

14140 000 - Cravinhos - SP

CNPJ 57.624.462/0001-05

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Município de Araçoiaba da Serra,

Rodovia Raposo Tavares Km 113 -SP,

CNPJ: 64.687.015/0001-52

INDÚSTRIA BRASILEIRA



Acesse a bula e outras informações sobre este medicamento usando o código ao lado.

Obrigado por nos deixar cuidar da saúde do seu pet!



faleconosco@biovet.com.br



WhatSac:

(11) 9 9545-5595



SAC:

0800 055 6642

**biovet**  
vet para todos