

Veloce 0,5%



ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL ORAL PARA CÃES

Uso Veterinário

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Veloce 0,5%	
Meloxicam	0,50 g
Veículo q.s.p.	100 mL

DESCRIÇÃO

Veloce 0,5% é um anti-inflamatório não-esteroidal (AINE) à base de meloxicam, com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2), que atua bloqueando os mediadores de inflamação, proporcionando um efeito anti-inflamatório. Além das ações anti-inflamatórias, os AINEs possuem ações analgésicas, antipiréticas e inibidoras de plaquetas, pois atuam bloqueando a síntese de prostaglandinas.

Veloce 0,5% é apresentado na forma de solução oral spray, acoplado a uma válvula que gira 360 graus, facilitando a administração do produto, proporcionando menos estresse na aplicação. Sua primeira absorção ocorre nas mucosas (Sistema de Absorção Transmucosa - S.A.T.), pois penetra facilmente nos tecidos, atingindo 100% de biodisponibilidade por via oral.

FARMACOCINÉTICA

A absorção do **Veloce 0,5%** ocorre mais rápido do que as apresentações em comprimidos. Em estudo de biodisponibilidade, avaliamos que o tempo médio dos picos plasmáticos individuais dos cães, ocorrem pouco mais de 2 horas, garantindo maior concentração e uma absorção até 4 vezes mais rápida do que apresentações de meloxicam comprimido.

INDICAÇÕES

Veloce 0,5% é indicado para o tratamento de quadros inflamatórios que acometem os cães.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém foram conduzidos estudos pela empresa fabricante que demonstraram que o produto apresenta as características desejadas e necessárias de eficácia e segurança para a indicação a que se destina, obtendo, dessa forma, emissão de Licença Provisória.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

Veloce 0,5% é apresentado na forma de solução oral e deve ser administrado exclusivamente via spray, utilizando a válvula que acompanha o produto, uma vez ao dia (intervalo de 24 horas entre as doses), de acordo com a tabela abaixo:

Cães	
1º dia	2º dia em diante
2 borrifadas para cada 10kg, uma vez ao dia, equivalente a 0,2 mg/kg	1 borrifada para cada 10kg, uma vez ao dia, equivalente a 0,1 mg/kg

O período de tratamento deverá ser determinado de acordo com a severidade do quadro ou a critério do Médico Veterinário, por pelo menos 3 dias consecutivos.

De acordo com os estudos de segurança realizados, o tratamento poderá ser prolongado por até 28 dias consecutivos em cães adultos.

Para tratamento em cães filhotes, pode ser indicada terapia por até 7 dias consecutivos.

1



Encaixe a válvula

2



Pressionar até o preenchimento da câmbula

3



Posicione a válvula entre a bochecha e os dentes do pet para iniciar as borrifadas, conforme a dose descrita na tabela

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não administrar o meloxicam com outros anti-inflamatórios não esteroidais ou com corticosteróides, que possam exacerbar os efeitos adversos gastrointestinais. Não recomendamos administrar em pacientes que fazem uso de medicamentos para hipertensão e problemas cardíacos (antagonistas da ECA), ou pacientes que façam uso concomitante com drogas anticoagulantes, como warfarina e aspirina.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

O produto é contraindicado para uso em animais com antecedentes de hipersensibilidade ao meloxicam.

Utilizar com cautela e acompanhamento veterinário em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais severos.

Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentaram perfuração gastrointestinal ativa ou recente.

Não administrar em animais com trombocitopenia/plaquetopenia, pois pode aumentar o risco de sangramento.

Não foram realizados estudos de segurança em fêmeas gestantes ou em fase de lactação.

Não foram realizados estudos de segurança em animais com idade inferior a 3 (três) meses de idade.

Não foram realizados estudos de segurança em animais idosos.

Não utilizar em animais com menos de 10 Kg.

PRECAUÇÕES

Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto. Não utilizar o produto vencido. O descarte deve ser realizado de acordo com a legislação vigente.

REAÇÕES ADVERSAS

Nos estudos de segurança realizados com o produto **Veloce 0,5%** não foram observadas reações adversas na dosagem indicada.

Apesar do meloxicam ser inibidor seletivo da COX-2, apresentando mínimos efeitos gastrolesivos e ulcerogênicos, podem ocorrer reações adversas como vômito, inapetência, dor abdominal, gastrite e sialorreia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento.

PRAZO DE VALIDADE

O período de validade do produto é de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação. Após abertura da embalagem, utilizar o produto em até 6 meses.

CONSERVAÇÃO

Conservar o produto à temperatura ambiente, entre 15° C e 30° C, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob nº 54/2022 em 26/12/2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO VETERINÁRIO

Dr. Danillo Silva Marcon - CRMV-SP 36.982.

PROPRIETÁRIO

Laboratório Bio-Vet Ltda.

R. Cel. José Nunes dos Santos, 639

06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP

CNPJ 60.411.527/0001-30

INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICANTE

Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Araçoiaba da Serra,

Rodovia Raposo Tavares Km 113 -SP,

CNPJ: 64.687.015/0001-52

INDÚSTRIA BRASILEIRA



Acesse a bula e outras informações sobre este medicamento usando o código ao lado.

Obrigado por nos deixar cuidar da saúde do seu pet!



faleconosco@biovet.com.br



WhatSac:

(11) 9 9545-5595



SAC:

0800 055 6642

biovet
vet para todos