

Vermivet Plus



VERMÍFUGO ORAL DE AMPLO ESPECTRO PARA CÃES

Uso Veterinário

FÓRMULA

Cada comprimido de **Vermivet Plus** contém:

Vermivet Plus	330mg	660mg	2g
Pamoato de Pirantel	72,5 mg (25 mg de Pirantel base)	145 mg (50 mg de Pirantel base)	435 mg (150 mg de Pirantel base)
Praziquantel	25 mg	50 mg	150 mg
Febantel	75 mg	150 mg	450 mg
Excipiente q.s.p.	330 mg	660 mg	2 g

DESCRIÇÃO

Produto composto de Pamoato de Pirantel, Praziquantel e Febantel que garantem amplo espectro de ação contra formas adultas e larvais dos principais cestóides e nematóides dos cães, com grande margem de segurança, já que a dose tóxica é extremamente superior às recomendadas.

INDICAÇÕES

Vermivet Plus é um vermífugo de amplo espectro e portanto indicado para combater as formas adultas e larvais dos principais cestóides e nematóides dos cães, a saber:

1 <i>Ancylostoma caninum</i>	8 <i>Joyeuxiella pasqualei</i>	15 <i>Taenia taeniaeformis</i>
2 <i>Ancylostoma tubaeforme</i>	9 <i>Mesocestoides corti</i>	16 <i>Toxocara canis</i>
3 <i>Dipylidium caninum</i>	10 <i>Spirometra mansonioides</i>	17 <i>Toxocara cati</i>
4 <i>Diphyllobothrium erinacei</i>	11 <i>Taenia hydatigena</i>	18 <i>Toxascaris leonina</i>
5 <i>Echinococcus granulosus</i>	12 <i>Taenia multiceps</i>	19 <i>Trichuris vulpis</i>
6 <i>Echinococcus multilocularis</i>	13 <i>Taenia ovis</i>	20 <i>Uncinaria stenocephala</i>
7 <i>Giardia</i> spp.	14 <i>Taenia pisiformis</i>	

O Febantel age em 1, 2, 3, 7, 15, 16, 17, 19

O Praziquantel age em 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

O Pamoato de Pirantel age em 1, 16, 18, 20

A verminose 7, deve ser tratada na dose recomendada por três dias consecutivos. Repetir o tratamento após 15 dias. As verminoses 4 e 10 devem ser tratadas com mais metade (1/2) da dose recomendada e por período de três dias seguidos.

Ex: Dose Normal Recomendada = 2 comprimidos, nestes casos dar 3 comprimidos por 3 dias e repetir o tratamento após 15 dias.

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Dipylidium caninum tem como hospedeiro intermediário as pulgas e desta forma aconselha-se que sejam combatidas. O controle das verminoses depende da vermifugação, assim como da lavagem e desinfecção dos ambientes de criação.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

Vermivet Plus deve ser administrado por via oral, em dose única, sendo a dose repetida após 15 dias, de acordo com o peso do animal. Não há necessidade de jejum ou alimentação especial quando de sua administração.

POSOLOGIA

Filhotes: devem ser tratados a partir de 15 dias de idade. A vermifugação dos filhotes é fundamental para seu desenvolvimento físico e imunológico.

Fêmeas: antes de serem cobertas e 10 dias antes do parto, com o intuito de diminuir a infestação dos filhotes.

Adultos: O tratamento deve ser repetido a cada 3 meses.

Comprimido de 330mg

Espécie	Peso do animal	Dose
Cão	até 2,5 kg	1/2 comprimido 
	acima de 2,5 kg até 5 kg	1 comprimido 
	acima de 5 kg até 7,5 kg	1 e 1/2 comprimidos 
	acima de 7,5 kg	2 comprimidos 

Comprimido de 660mg

Espécie	Peso do animal	Dose
Cão	até 5 kg	1/2 comprimido 
	acima de 5 kg até 10 kg	1 comprimido 
	acima de 10 kg até 15 kg	1 e 1/2 comprimidos 
	acima de 15 kg até 20 kg	2 comprimidos 

Comprimido de 2g

Espécie	Peso do animal	Dose
Cão	acima de 10 kg até 15 kg	1/2 comprimido 
	acima de 15 kg até 30 kg	1 comprimido 
	acima de 30 kg até 45 kg	1 e 1/2 comprimidos 
	acima de 45 kg até 60 kg	2 comprimidos 

A posologia pode ser alterada conforme o tipo e grau de infestação, à critério do médico veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES

Vermivet Plus contém princípios ativos com grande margem de segurança para os cães e desta forma não possui contra-indicação.

REAÇÕES ADVERSAS

Vermivet Plus não possui efeitos colaterais, quando administrado da forma recomendada.

APRESENTAÇÃO

Vermivet Plus 330 mg: Cartucho contendo 1 strip com 2 comprimidos.

Vermivet Plus 660 mg: Cartucho contendo 1 strip com 4 comprimidos.

Vermivet Plus 2,0 g: Cartucho contendo 1 strip com 2 comprimidos

PRAZO DE VALIDADE

O produto tem prazo de validade de 2 (dois) anos, após a data da fabricação.

CONSERVAÇÃO

Conservar o produto à temperatura ambiente em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 2548/86 em 03/07/86.

RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO VETERINÁRIO

Dr. Danilo Silva Marcon
CRMV-SP 36.982.

PROPRIETÁRIO

Laboratório Bio-Vet Ltda.
R. Cel. José Nunes dos Santos, 639
06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP
CNPJ 60.411.527/0001-30
INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICANTE

Vansil Indústria Comércio e Representações Ltda.
Rua João Augusto Cirelli, 640
13690-000 - Descalvado-SP
CNPJ 50.472.547/0001-68
INDÚSTRIA BRASILEIRA



Acesse a bula e outras informações sobre este medicamento usando o código ao lado.

Obrigado por nos deixar cuidar da saúde do seu pet!



faleconosco@biovet.com.br

WhatSac:
(11) 9 9545-5595

biovet
vet para todos